

DESCRIPTIONS DE NOUVELLES ESPÈCES DE BUPRESTIDES

PAR A. THÉRY

Cyphogastra Loriae n. sp. — Long. 26 mm., larg. 9,25 mm. Allongé, médiocrement atténué postérieurement, ayant sa plus grande largeur après le milieu des élytres, d'un brun-bronzé en dessus avec les impressions d'un cuivreux doré clair; le dessous d'un bronzé clair.

Tête grossièrement et peu densément ponctuée sur le front, à ponctuation plus fine et formée de points allongés sur le vertex et presque nulle sur la zone séparant le front et le vertex; le front avec une impression triangulaire divisée en deux par un profond sillon, sans délimitation entre lui et l'épistôme sauf quelques impressions; épistôme fortement échancré et finement bordé de roux; le bord supérieur des yeux avec un fin sillon s'atténuant avant le milieu de ceux-ci; antennes moyennes.

Pronotum plus large que long, droit sur les côtés qui sont parallèles sur presque toute la longueur, brusquement rétréci en avant avec la troncature des angles antérieurs fortement sinuée, la marge antérieure fortement biéchancrée avec le lobe médian large, le fond des échancrures cilié, les angles antérieurs saillants en avant et aigus, les postérieurs faiblement aigus, la base bisinuée avec le lobe médian large et peu saillant; le disque largement et profondément sillonné, le sillon plus large en avant, n'atteignant pas tout à fait le bord antérieur et brusquement interrompu avant celui-ci, les bords entièrement envahis par une large et profonde impression allongée, très nettement délimitée, un peu étranglée vers le tiers antérieur, touchant le bord dont elle est séparée par un mince bourrelet complètement oblitéré dans le sinus de la troncature antérieure et s'épaississant dans les angles postérieurs pour former un gros calus triangulaire allongé; en avant l'impression touche le bord antérieur, elle est extrêmement finement pointillée, à aspect mat et soyeux et recou-

verte d'une fine pubescence couchée, visible à la loupe et ne voilant pas le fond; la ponctuation du disque est rare et composée de quelques petits points dans le fond du sillon et de quelques points plus gros à la base.

Ecusson en trapèze, rétréci antérieurement.

Elytres un peu plus larges que le pronotum à l'épaule, très faiblement sinués derrière celle-ci, en courbe régulière jusqu'au sommet avec leur plus grande largeur après le milieu, rebordés latéralement jusqu'au tiers postérieur, finement sillonnés sur la moitié antérieure de leurs bords, le sillon remplacé vers le tiers postérieur par une large impréssion très allongée, à fond très finement pointillé et doré, n'atteignant pas l'apex, cette impression porte quelques points plus forts, isolés et est recouverte d'une très fine pubescence analogue à celle des impressions du pronotum; l'apex est armé de 8 à 9 épines irrégulières et d'une dent suturale assez faible; le disque porte de chaque côté de la base trois impressions allongées dont les intervalles forment des rudiments de côtes; la ponctuation est très forte, peu régulière et assez nettement disposée en lignes, elle va en s'atténuant jusqu'au sommet où elle est faible mais encore visible; de chaque côté de la suture et à hauteur des impressions latérales se trouve une impression semblable et en forme de sillon.

Flancs du prothorax lisses sur les bords, finement pointillés au milieu et finement pubescents; marge antérieure du prosternum largement et peu profondément échancrée, avec une strie transversale bien marquée à peu de distance du bord; la saillie élargie en arrière, bordée d'un gros bourrelet lisse, aplati, avec quelques points épars, fortement sillonnée au milieu, le fond du sillon très finement pointillé, et recouvert de pubescence serrée, le sommet de la saillie profondément encastré entre les branches latérales du mésosternum, arrondi à l'extrémité; métasternum faiblement sillonné au milieu, finement pointillé sur les côtés et pubescent; hanches postérieures fortement dilatées au côté interne avec un calus brillant dans leurs angles postéro-internes; saillie intercoxale du 1.^{er} segment abdominal très bombée, large, complètement arrondie en arrière et nettement délimitée postérieurement, couverte de gros points régulièrement espacés; la suture des deux premiers sternites abdominaux très nette même au milieu où elle forme une forte sinuosité pour le logement de la plaque

abdominale intercoxale. Abdomen très finement pointillé et finement pubescent sauf sur la ligne médiane qui est lisse, irrégulière et éparsément ponctuée et sur les côtés des segments où on remarque des plaques lisses peu ponctuées formant de chaque côté une bande interrompue.

Patrie: Nouvelle-Guinée, S. O. Fiume Purari (Dr. L. Loria).

Un exemplaire des collections du Musée Civique d'histoire naturelle de Gênes.

Cette espèce vient se placer dans le voisinage de *C. venerea* avec laquelle elle offre une certaine ressemblance par la forme et la disposition des impressions, mais elle en diffère nettement par sa coloration, sa forme moins atténuée postérieurement etc.

Pachyscelus Solarii n. sp. — Long. 3,75 mm., larg. 1,25 mm. Triangulaire, arrondi en avant et atténué en ligne faiblement courbe de l'épaule au sommet; noir avec les élytres bleus et ornés d'une petite fascie antéapicale, très nette, formée d'une pubescence serrée d'un blanc pur.

Tête très bombée en avant, arrondie, yeux nullement saillants; ponctuation formée de quelques points superficiels à peine marqués; épistôme fortement étranglé entre les cavités antennaires, séparé du front par un petit trait aux extrémités duquel on remarque un petit point enfoncé, faiblement échancré antérieurement; antennes subcylindriques, à articles rugueux, le 2.^{ème} article aussi gros que le premier, les articles 3, 4, et 5 globulaires, les suivants très serrés et à denticulation indistincte, logées dans un sillon situé sur l'épisternum prothoracique, parallèlement au bord de celui-ci et en restant distant; le bord postérieur de ce sillon forme la continuation de la marge antérieure du prosternum.

Pronotum beaucoup plus large que long, ayant sa plus grande largeur à la base, fortement échancré au bord antérieur, avec les angles antérieurs aigus et abaissés, les côtés très obliques et régulièrement arqués, entièrement rebordés, les angles postérieurs très aigus et prolongés sous l'épaule, la base presque droite avec une petite échancrure de chaque côté de l'écusson, le disque uni, régulièrement bombé, très brillant, sans ponctuation visible au milieu et avec quelques points cicatriciels dans les angles postérieurs.

Écusson grand, lisse brillant, en triangle, plus large que long.

Elytres plus étroits à la base que le pronotum, avec les bords droits et presque parallèles sur le tiers antérieur, puis atténués jusqu'au sommet où ils sont conjointement arrondis et très nettement denticulés, le calus huméral assez saillant, une forte impression sur les bords à hauteur des hanches postérieures; ils sont ornés de 5 à 6 lignes de points régulièrement disposées sur le disque, les points sont bien marqués, larges et peu profonds. et vont en diminuant jusqu'au sommet qui est complètement lisse; après le quart postérieur on remarque une fascie transverse très apparente, oblique, et allant du bord à la moitié de la largeur de l'élytre, subdivisée en deux parties et formée de poils couchés d'un blanc argenté.

Prosternum très large, finement rebordé antérieurement, largement et peu profondément échancré, la saillie prosternale très large en arrière, la surface très faiblement ponctuée, les branches latérales du mésosternum beaucoup plus larges que longues, réduites à une faible bande longeant la cavité cotyloïde intermédiaire; métasternum à ponctuation distincte et cicatricielle; abdomen presque lisse, suture du premier et deuxième sternite bien visible; tibias postérieurs finement denticulés sur leur tranche externe le long de la partie dilatée, ciliés en peigne sur leur tiers médian et garnis extérieurement de longues soies. Dernier segment abdominal ♂ avec une impression ovale au milieu, lobé au sommet, le lobe largement et faiblement échancré à l'extrémité ayant de chaque côté de l'échancrure un groupe de trois dents dont la médiane est la plus saillante et la plus robuste, l'externe située à un niveau inférieur à celui de l'interne.



Cette espèce ressemble à *P. inca* Kerr. par la coloration et la disposition de la fascie antéapicale, mais elle est plus grande et plus triangulaire et les caractères sexuels secondaires des mâles sont différents.

Patrie: Managua, Nicaragua (Dr. A. Solari). Trois exemplaires de ma collection et un même nombre dans celle du Musée Civique d'histoire naturelle de Gênes.

J'avais autrefois reçu cette espèce de M. Solari et M. le Dr. Gestro vient de m'en communiquer des exemplaires provenant des chasses du même naturaliste, auquel je me fais un plaisir de la dédier.

Pachyscelus Dugesi n. sp. — Long. 2,5 mm. — Subovale, noir bronzé, élytres bleus; dessous noir.

Tête peu bombée, yeux à peine saillants, ponctuation formée de points forts et espacés, milieu du front avec un fin sillon.

Pronotum beaucoup plus large que long, ayant sa plus grande largeur à la base, échancré au bord antérieur qui est rebordé de chaque côté avec un petit sillon près des angles qui sont aigus et abaissés: les côtés très obliques, arrondis en avant, droits sur presque toute leur longueur et un peu arrondis à nouveau près des angles postérieurs, rebordés par une fine carène relevée en gouttière; les angles postérieurs très aigus et débordant l'épaule qu'ils entourent, la base avec une très petite échancrure de chaque côté de l'écusson, le disque régulièrement uni avec des petits points cicatriciels, rares au milieu, beaucoup plus forts et plus serrés sur les côtés.

Écusson grand, noir, uni, plus large que long, en triangle, avec les angles antérieurs arrondis.

Élytres un peu plus étroits à la base que le pronotum, avec les côtés subparallèles jusqu'à hauteur des hanches postérieures, puis atténués jusqu'au sommet où ils sont conjointement arrondis, mais avec l'angle sutural arrondi, extrêmement finement denticulés au sommet; calus huméral saillant avec une forte impression derrière l'épaule; la marge aplatie et saillante en fine carène très aigüe, de l'épaule au sinus latéral; base impressionnée de chaque côté, disque couvert de lignes régulières de gros points, ces lignes obsoletés sur les côtés et au sommet, mais toujours bien visibles, les points émettant chacun un petit poil blanc bien visible à la loupe.

Dessous noir; dernier segment abdominal arrondi avec une petite pointe médiane, impressionné et subsilloné le long de son bord qui est couvert de strigosités, la pointe est plus ou moins accentuée suivant les individus, le disque de ce sternite porte des poils dressés, espacés. Prosternum très large, finement marginé, faiblement échancré, couvert de petits poils épars comme tout le dessous; saillie prosternale large, subrectangulaire, tronquée au sommet, les branches du mésosternum obliques; tibias postérieurs échancrés et ciliés sur le milieu de leur tranche externe.

Patrie: Guanajuato, Mexique. Trois exemplaires de ma collection et un des collections du Musée Civique de Gènes, provenant des récoltes de Dugès et paraissant tous des ♀.